

Mise à jour du FBCC, printemps 2026 Rappel concernant la migration et la biosécurité

Le 6 avril 2026

Le FBCC souhaite rappeler à tous les producteurs de volailles de l'Ontario que le printemps est une période à risque élevé pour la grippe aviaire hautement pathogène en raison des migrations des oiseaux sauvages. Tous les producteurs et partenaires de l'industrie doivent suivre rigoureusement leurs protocoles de biosécurité quotidiens pendant cette saison à haut risque et renforcer les mesures de biosécurité lorsque cela est nécessaire pour aider à prévenir la propagation de la maladie dans la province et parmi les troupeaux de volailles.

RAPPEL POUR TOUS LES PRODUCTEURS DE VOLAILLE ET LES INTERVENANTS DE L'INDUSTRIE

Nous encourageons vivement tous les producteurs de volailles et les partenaires de l'industrie à appliquer des mesures de biosécurité renforcées (qui se trouvent [ICI](#)).

Il est rappelé aux producteurs qu'en cas d'activité à haut risque, ils doivent disposer d'un équipement de protection individuelle (EPI) approprié en matière de biosécurité pour eux-mêmes, leurs employés et toute personne entrant dans leurs installations. Les recommandations du ministère de la santé en matière d'EPI pour les travailleurs de l'Ontario exposés à divers degrés au risque d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) peuvent être consultées à l'adresse suivante [ici](#).

SIGNES CLINIQUES DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES

Les signes cliniques de l'IAHP chez les volailles domestiques peuvent être les suivants

- un taux de morbidité et de mortalité élevé et soudain
- diminution de la consommation d'eau et d'aliments
- dépression extrême
- baisse de la production d'œufs
- signes de septicémie

Si vous constatez des signes de problèmes de santé dans votre troupeau, veuillez contacter immédiatement votre vétérinaire et votre office.

OISEAUX ET ANIMAUX SAUVAGES MALADES OU MORTS SUR VOTRE PROPRIÉTÉ

Les producteurs doivent signaler les oiseaux sauvages et les animaux sauvages malades ou morts trouvés sur leur propriété au Réseau canadien pour la santé de la faune (RCSF) en appelant le 1-866-673-4781 ou en envoyant un courriel à on-nu@cwbc-rscsf.ca. Évitez tout contact direct avec des animaux sauvages vivants ou morts, y compris les oiseaux sauvages. Si vous devez manipuler des animaux sauvages ou des oiseaux sauvages malades ou morts, suivez les [conseils pour vous protéger lorsque vous manipulez des animaux sauvages](#).



SITUATION ACTUELLE

Des détections d'IAHP chez les oiseaux sauvages et la faune sauvage, y compris les mammifères, continuent d'être signalées au [Canada](#) et aux [États-Unis](#).

En Ontario, deux fermes font actuellement l'objet d'une quarantaine contre l'influenza aviaire hautement pathogène. Il y a une zone de sécurité commerciale active dans la ville d'Amherstburg. Depuis le 2 avril, 21 autres sites au Canada font l'objet de restrictions associées à des quarantaine en raison de l'IAHP, qu'il s'agisse de volailles commerciales ou non commerciales.

Au cours des 30 derniers jours, l'IAHP a également été détectée dans 34 élevages commerciaux et 23 petits troupeaux aux États-Unis. [Les détails peuvent être trouvés ici](#).

ÉTUDE SUR LES FACTEURS DE RISQUE DE L'IAHP

Un projet de recherche collaboratif financé en partie par l'Alliance pour l'innovation agroalimentaire en Ontario comprenait une étude qui comparait les pratiques agricoles et de biosécurité dans les fermes commerciales de viande de dinde infectées et non infectées au Québec et en Ontario afin d'identifier les facteurs de risque significatifs pour l'introduction de la grippe aviaire hautement pathogène. Les premiers résultats de l'évaluation des facteurs de risque sont résumés dans la figure ci-dessous et peuvent être consultés sur le site Web du [FBCC](#).

Pratiques pour protéger sa ferme contre la grippe aviaire

Pratiques à éviter	Pratiques à adopter
 Déplacer les dindons avec exposition extérieure, sans décontaminer	 Envoyer les dindons à l'abattoir en une seule étape (tout-vide)
 Laisser temporairement les dindons morts à l'extérieur sans protection	 Protéger la litière propre de la faune ou ne pas en entreposer
 Composter les dindons morts dans un système ou un bâtiment ouvert	 Sortir les mortalités des bâtiments de façon régulière et sécuritaire
 Collecter les dindons morts près des bâtiments	 Élever les dindons sur béton plutôt que sur terre battue
	

Caractéristiques qui augmentent le risque d'infection

 Proximité d'une ferme commerciale de volaille infectée	 Grande ferme : nombreux cycles de production, bâtiments ou employés	 Gestion déléguée à un gérant de ferme
---	--	---

Lamer et al., 2025, en préparation. Créé avec Canva et des outils d'IA générative (Copilot).